

# Neotigason

Behandling med Neotigason. Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de stilles til hudlægen.

## Hvordan virker Neotigason

Neotigason er kemisk beslægtet med A-vitamin. Behandling med Neotigason medfører, at huden bliver tyndere. Dette udnyttes til behandling af hudsygdomme, hvor hornlaget er fortykket. Det kan dreje sig om psoriasis og nogle sjældne hudsygdomme.

Virkningen indtræder i reglen efter adskillige ugers behandling. I reglen fortsættes behandlingen i måneder, hvorefter den så vidt muligt aftrappes.

## Hvordan tages Neotigason

Kapslerne bør tages med mælk og eventuelt i forbindelse med et måltid.

## Neotigason og anden medicin

Da Neotigason er beslægtet med A-vitamin, bør man i behandlingsperioden ikke tage mere A-vitamin dgl. end det, der er i en almindelig vitamintbl. Neotigason bør ikke anvendes sammen med Tetracyclin. Det er vigtigt at oplyse lægen om anden medicin som du tager.

## Bivirkninger

Næsten alle får tør hud og tørre læber i løbet af behandlingsperioden. Slimhinder i øjne og næse kan også tørre ud. Dette kan føre til besvær med at bruge kontaktlinser og til næseblod. Fede cremer hæmmer udtørringen af huden. Læbepomade og vaselin kan anvendes på læberne og i næseborene.

Under behandlingen kan fedtmængden i blodet stige og leveren kan påvirkes. Derfor tages blodprøver under behandlingen. Denne kontrol har særlig betydning for personer med sukkersyge, og hvis man er overvægtig.

Sjældne bivirkninger omfatter led- og muskelsmerter samt påvirkning af leveren. Hårtab kan forekomme.

Alle disse påvirkninger er ufarlige og svinder, når man ophører med behandlingen eller nedsætter dosis.

Ved langvarig behandling kan der i sjældne tilfælde ses knogleforandringer.

## Prævention, graviditet og amning

Neotigason er fosterbeskadigende. Derfor er der ved behandling af kvinder vigtigt at bruge sikker prævention i behandlingsperioden og mindst 2 år efter ophør af behandlingen. Man må under ingen omstændigheder blive gravid, mens man behandles med stoffet eller indtil 3 år efter afsluttet behandling. Skulle graviditet opstå i denne periode, må abort tilrådes.

Amning frarådes i behandlingsperioden.

Neotigasinkapsler må ikke gives til andre.  
Aflever evt. overskydende medicin til apoteket.

**Rettet d. 6. januar 2019**